

テブレノン(2329012)

---

【成分】

1カプセル中、テブレノン 50mg

【適応と用法】

- (1) 次の疾患の胃粘膜病変(びらん,出血,発赤,浮腫)の改善:急性胃炎,慢性胃炎の急性増悪期
- (2) 胃潰瘍。ただし,(1)はセルベックスだけ

テブレノンとして1日 150 mg,食後3回に分服(増減)

【注意事項】

(5) 調剤上の留意事項:細粒剤は,合成ケイ酸アルミニウムとの配合により,次第に黄変し,含量が低下するので配合剤とせず,組み合わせ剤とする

(6) 室温保存

(7) 規制等:指

【副作用】

(1) 副作用:総症例 10,914 例中,52 例(0.48%)の副作用が報告されている(再審査終了時)

0.1~5%未満 0.1%未満

消化器 便秘,下痢,嘔気,口渇,腹痛,腹部膨満感

肝臓 GOT,GPT の上昇

精神神経系 頭痛

過敏症(注) 発疹,そう痒感

その他 総コレステロールの上昇,眼瞼の発赤・熱感

(注)このような症状が現れた場合には中止する

(2) 高齢者への投与:一般に高齢者では生理機能が低下しているので,減量するなど注意する

(3) 妊婦・産婦・授乳婦等への投与:妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にだけ投与する [妊娠中の投与に関する安全性は確立していない]

(4) 小児等への投与:小児に対する安全性は確立していない(使用経験がない)

【長期】

【備考】