

## 硫酸ゲンタマイシン

---

### 【成分】

[軟]・クリーム：0.1%(力価)

### 【適応と用法】

外用用：緑膿菌,変形菌,大腸菌,クレブシエラ・エンテロバクター菌,ブドウ球菌,レンサ球菌による次の諸症

- (a)膿痂疹
- (b)湿疹及び類症,ざ瘡,皮膚潰瘍などの二次感染の治療

外用用：1日1~数回塗布するか,あるいはガーゼなどにのばしたものをはる。用法関連注意：使用に当たっては,耐性菌の発現等を防ぐため,原則として感受性を確認し,疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめる

### 【注意事項】

外用用：

(1)禁忌：本剤並びに他のアミノグリコシド系抗生物質及びバシトラシンに対し過敏症の既往歴のある患者

(2)重要な基本的注意

(a)感作されるおそれがあるので,観察を十分に行い感作されたことを示す兆候(そう痒,発赤,腫脹,丘疹,小水疱等)が現れた場合には中止する

(b)長期間連用しない

(3)副作用：使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため,発現頻度については文献,自発報告等を参考に集計した(再審査対象外)。次の症状が現れることがあるので,観察を十分に行い,このような症状が現れた場合には適切な処置を行う

頻度不明 0.1%未満

過敏症(注1) 発疹等

その他(注2) 腎障害,難聴

(注1)このような症状が現れた場合には中止する

(注2)このような症状が現れる可能性があるため,長期連用を避ける

(4)適用上の注意 投与経路：眼科用に使用しない

(5)室温保存