

ジメチコン(2318001)

---

【成分】

1ml 中、ジメチコン 20mg

【適応と用法】

- (1) 胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善
- (2) 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去
- (3) 腹部 X 線検査時における腸内ガスの駆除

ジメチコンとして

- (1) 胃腸管内のガスに起因する腹部症状の改善：1 日 120～240 mg, 食後又は食間 3 回に分服(増減)
- (2) 胃内視鏡検査時における胃内有泡性粘液の除去：検査 15～40 分前に 40～80 mg, 約 10 mL の水と共に服用(増減)
- (3) 腹部 X 線検査時における腸内ガスの駆除：検査 3～4 日前から, 1 日 120～240 mg, 食後又は食間 3 回に分服(増減)

【注意事項】

(2) 適用上の注意

- (a) 調製時(錠)：フェノバリン等のフェノールフタレイン系薬剤との配合によりピンク色に着色するが, 薬効に影響はない
- (b) 投薬時(シロップ)：振とう後使用する
- (3) 室温保存

【副作用】

(1) 副作用：投与された総計 2,546 例中 16 例(0.63%)に副作用がみられた。主なものは胃腸症状で, 軟便 8 例(0.31%), 胃部不快感 4 例(0.16%), 下痢 3 例(0.12%), 腹痛 3 例(0.12%)などであった。臨床検査については異常な変動を認めた症例はなかった(再評価終了時)

0.1～5%未満 0.1%未満

消化器 軟便, 胃部不快感, 下痢, 腹痛 嘔吐, 嘔気, 食欲不振, 胃部重圧感  
その他 頭痛

【長期】

【備考】