

サリチル酸(2652701)

---

【成分】

5%,10%

【適応と用法】

絆創膏：疣贅・鶏眼・胼胝腫の角質剥離

外皮用：乾癬,白癬(頭部浅在性白癬,小水疱性斑状白癬,汗疱状白癬,頑癬),癩風,紅色靴糠疹,紅色陰癬,角化症(尋常性魚鱗癬,先天性魚鱗癬,毛孔性苔癬,先天性手掌足底角化症(腫),ダリエー病,遠山連圈状靴糠疹),湿疹(角化を伴う),口囲皮膚炎,掌蹠膿疱症,へブラ靴糠疹,アトピー性皮膚炎,ざ瘡,せつ,腋臭症,多汗症,その他角化性の皮膚疾患

症状に応じて次の濃度の軟膏剤,又は液剤とし,1日1~2回塗布又は散布。小児0.1~3%,成人2~10%。なお,疣贅,鶏眼,胼胝腫には,通常,50%の絆創膏を用い,2~5日目ごとに取り替える

【注意事項】

(1)禁忌：本剤に対し過敏症の既往歴のある患者

(2)重要な基本的注意：患部が化膿しているなど湿潤,びらんが著しい場合には,あらかじめ適切な処置を行った後使用する

【副作用】

(3)副作用：使用成績調査等の副作用発現頻度が明らかとなる調査を実施していない

種類\頻度 頻度不明

過敏症(注) 過敏症状

皮膚(注) 発赤,紅斑等

長期・大量使用 内服,注射等全身的投与の場合と同様な副作用が現れることがある

(注)このような症状が現れた場合には中止する

(4)妊婦,産婦,授乳婦等への使用：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には,治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にだけ使用する [経口投与による動物実験で催奇形作用が報告されている]

(5)小児等への使用：慎重に使用する [乳児・小児では,副作用が発現しやすい]

(6)適用上の注意 使用時

(a)長期間使用しても症状の改善が認められない場合には,改めて診断し適切な治療を行うことが望ましい

(b)広範囲の病巣に使用した場合は,副作用が現れやすいので注意して使用する

(c)眼科用に使用しない

(7)(末・軟膏)室温・(絆創膏)遮光保存

(8)規制等：サリチル酸,サリチル酸絆創膏局